



Collis SC



COLLIS

Irtható kórokozók:

- Lisztharmat
- Szürkepenész

Általános adatok

Hatóanyag	200 g/l boscalid, 100 g/l krezoxim-metil
Hatóanyagcsoport	Anilid, strobilurin
Forgalmazási kategória	I.
Engedély száma	02.5/1334/2/2007
Formuláció	Vizes szuszpenziókoncentrátum (SC)
Kiszerezés	1 l
Eltarthatóság	2 év
Méregjelzés	p.o. LD50 értéke (patkányon): >5000 mg/kg
Toxicitás	Méhekre nem jelölésköteles Vízi szervezetekre közepesen veszélyes
Tűzveszélyesség	Nem jelölésköteles „E” tűzveszélyességi osztály
Munka-egészségügyi várakozási idő	0 nap
Egyéb információ	—

Engedélyezett kultúrák

Kultúra	Károsító / felhasználás	Dózis	É. v. i.	Kijuttatási időszak / fejlettség
Uborka	Lisztharmat	Szabadföld: 0,3–0,4 l/ha Hajtatott: 0,05–0,06%	3 nap	4 leveles állapottól a terméskötődésig
Szőlő	Lisztharmat, szürkepenész	0,3–0,4 l/ha	28 nap	A fűrtmegnyúlás és a fűrtzáródás között

Collis SC



Felhasználási előírások

Hatás / hatásspektrum	Szisztémikus és transzlamináris hatású. Lisztharmatgombák ellen hatékony, szőlőbotritisz elleni mellékhatással.
Hatáskifejtés	A gombák légzését gátolja a II. és a III. komplexben.
Kijuttatási idő	Preventíven, a fertőzési folyamat kezdetén.
A permetlé vízmennyisége	Uborka 400-600 l/ha (szabadföld), 500-1500 l/ha (hajtatott). Szőlő: 600-1000 l/ha.
Permetléporlasztás	Finomcseppes kijuttatás.
Ideális hőmérséklet	Nem befolyásoló tényező.
Ideális időszak	Nem befolyásoló tényező.
Hatásnövelő körülmények	A lisztharmatgomba-fertőzés pontos előrejelzése alapján történő kijuttatás növeli a hatékonyságot.
Kombinálhatóság	Az összes BASF Hungária Kft. által forgalmazott, szőlőben engedélyezett gombaölő és rovarölő szerrel keverhető.
A felhasználás gyakorisága	Évente legfeljebb 3 alkalommal. A két kezelés közti minimális várakozási idő uborkánál 10 nap, szőlőnél 12 nap.
Megjegyzés	—